Sektion Reinigung und Desinfektion

Arbeitsgruppe Reinigungsmitteltestung (AG RMT)

Fibrin-Prüfkörper – praxisnahes Prüfmodell zur Bewertung der Wirksamkeit von Reinigern

Dr. Markus Wehrl

wfk – Cleaning Technology Institute e.V.

23. Jahreskongress der DGSV e.V. 2019

03. Oktober 2019, Fulda

Wie werden Instrumentenreiniger richtig ausgewählt ?

Farbe des Kanisters

Farbe des Reinigers

Geruch des Reinigers

Etikettendesign

pH-Wert

Produktauslobung des Herstellers

Anwendungsbereich: maschinell/manuell

Art der Reinigungsgüter

Art der Verschmutzungen

Reiniger und Reinigungswirkung: Sinner und die 4 Parameter

Chemie: Konzentration ?, pH-Wert ?, Tensidgehalt ?, Enzyme ?, Wasserqualität ?

Temperatur: manuelle Verfahren: 20-30 °C ?, maschinelle Verfahren: 30-55 °C ?

Mechanik: manuell: Tauchen, intensives Bürsten ?, maschinell: Bauart des RDG ?

Zeit: hat keiner mehr....

Reinigungsprozesse können extrem unterschiedlich sein.

Worüber sich Gemüter streiten: Bewertung von Reinigern

Desinfektionsmittel (MP Klasse IIa)
Wirksamkeitsprüfung und Listung

- 30 EN-Normen, 20 prNormen (07/2018)
- RKI-Liste
- VAH-Liste

Instrumentenreiniger (MP Klasse I)
KEINE allgemein anerkannten Prüfmethoden verfügbar

Auftrag an die AG RMT:
Entwicklung von Prüfmethoden zur vergleichenden Bewertung
der Wirksamkeit von Instrumentenreinigern für:
manuelle Aufbereitung (Temp 20-30 °C)

Vorgaben bei der Methodenentwicklung

Prüfkörpermaterial / -oberfläche soll einen Bezug zur Instrumentenoberfläche haben
→ Edelstahl (1.4301), Längsschliff 80er Körnung

Prüfanschmutzung soll einen Bezug zur klinischen Relevanz chirurgischer Instrumente haben
→ Reaktiviertes Blut, bzw. bzw. Blutkomponenten

Proteinanschmutzung muss vollständig solubilisierbar sein

Quantifizierung von Restanschmutzungen anhand des Leitparameters Proteingehalt
→ *ortho*-Phthaldialdehyd (OPA)-Methode

Vorarbeiten

Ad hoc-Gruppe „Prüfanschmutzung und Methoden“ am DIN NA Med 063-04-09
 Köhnlein *et al.*, ZentrSteril 2008(6): 424-435

Set-up von Reinigungsexperimenten

Keine Mechanik

Manuelle Reinigung: Reinigungstemperatur 25 °C

Wasserqualität: **Wasser standardisierter Härte (WSH)** als Surrogat für „Stadtwasser“

Testreiniger 1 (TR-1): Alkalischer Reiniger zur manuellen Reinigung von Medizinprodukten mit Alkalispendern, Komplexbildnern, Dispergiermitteln, Lösungsvermittlern, oberflächenaktiven Stoffen und Netzmitteln, pH = 11,7 bei 1 % Konzentration, 20 °C

Testreiniger 2 (TR-2): Multienzymatischer Reiniger für die manuelle Reinigung von Medizinprodukten mit Proteasen, Lipasen und Amylasen, mit 5 - 15 % nichtionischen Tensiden, < 5 % anionischen Tensiden, Konservierungsmitteln, pH = 8,4 - 8,6 bei 0,1 - 3 % Konzentration, 20 °C

Reinigungsversuche mit Blutansmutzungen

0 min

5 min

10 min

15 min

Ringversuch mit Blutprüfkörpern (B-PCD)

In allen Versuchen mit reaktivierter Blutanschmutzung war WSH vergleichbar gut wie div. Reiniger.....(“± der beste Reiniger“).....

Hämoglobin macht **70 %** des Proteingehalts von Blut aus
Hämoglobin ist hervorragend wasserlöslich: **(50 % w/w !)**
Reiniger haben keinen Einfluss auf die Löslichkeit von Hämoglobin !

Die schwierig zu entfernende Blutkomponente ist das polymerisierte hochmolekulare und unlösliche Fibrin (1,1 – 5,0 % des Schafblutes)
→ **Fibrin liegt auf allen chirurgischen Instrumenten vor**

Fibrin kann **nicht** mit 1 % SDS (pH=11) bei RT solubilisiert werden

Auftragung von Schafblut, vollständige Koagulation

Hämoglobin und andere lösliche Proteine werden durch Waschung entfernt
→ Fibrin-Anschmutzung verbleibt (**Fibrin-Prüfkörper, F-PCD**)

Vollständige Solubilisierung von Fibrin in 1 % SDS (pH=11) durch
Dampfsterilisation (121 °C / 20 min) möglich

Prüfkörperform wurde angepasst, um hohe Empfindlichkeit
(geringe Verdünnung) zu erzielen

Eigenschaften F-PCD

- Edelstahl 1.4301, Maße: 12 x 80 x 1 mm
- Angeschmutzte Fläche: 6,0 cm²
- Aufgetragene Blutmenge: 100 µl → 16,66 µl / cm²
- Fibrinmenge: 380-950 µg / F-PCD (abhängig von Blutqualität)
- Fibrinanschmutzung völlig unlöslich in Wasser
- Fibrinprüfkörper lagerbar und langzeitstabil

Koaguliertes Schafblut

Getrocknete Prüfkörper
F-PCD

Blut aufgetragen

Hämoglobin ausgewaschen

F-PCD getrocknet

Getrocknete F-PCD mit Amidoschwarz gefärbt

Ringversuch mit F-PCD

Wiederholung des Ringversuchs

Zusammenfassung - 1

- Es konnte erstmals die Überlegenheit von Instrumentenreinigern im Vergleich zu Wasser quantitativ demonstriert werden.
- Alkalische Reiniger: geringere Fibrinrückstände als in Wasser, jedoch keine vollständigen Entfernung (→ Process **Challenge Device!**)
- Enzymatische Reiniger: sehr geringe Fibrinrückstände nach 20 oder 30 min. Enzymwirkung benötigt jedoch verlängerte Inkubationszeit.

Proteinentfernung

Reiniger	Arithm. Mittel [%]	SD [%]
WSH	22,7	6,2
TR-1	43,2	8,0
TR-2	94,9	4,2

*6 Labore, 2 Versuchsdurchgänge mit je n=3 für 30 min
Reinigungszeit, gesamt n=36 F-PCD*

Erfolgreiche Etablierung einer praxisrelevanten Prüfmethode zur vergleichenden Bewertung von Instrumentenreinigern mit hervorragender Reproduzierbarkeit

Features:

- i) Keine Mechanik im Sinne von Sinner → Tauchmodell
- ii) Testtemperatur ist 25 °C für Reiniger zur man. Aufbereitung
→ Anpassbar für andere Reiniger und Anwendungen
- iii) F-PCD bestehen aus quervernetztem und völlig unlöslichem Fibrin
→ Anforderungsvolle Testanschmutzung, zugleich hohe Praxisrelevanz
- iv) Quantitative Auswertung → Anwendbar sind OPA, BCA, TOC

HAUPTARTIKEL | Prüfmethode für die vergleichende Bewertung von Instrumentendetergenzien zur manuellen Aufbereitung

Mitteilung

Arbeitsgruppe Reinigungsmitteltestung - AG RMT der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, DGKH e.V.

Prüfmethode für die vergleichende Bewertung von Instrumentenreinigern zur manuellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten auf der Basis von Fibrin

M. Wehrl¹, U. Rosenberg², F.H.H. Brill³, H. Gabriel⁴, A. Kampe⁵, W. Michels⁶, K. Roth⁷, L. Schnieder⁸, P. Frey⁹, J. Köhnlein¹⁰, O. Rlebe¹¹, A. Hartung¹², R. Bloß¹³, G. Kirmse¹⁴, M.-T. Linner¹⁵, D. Martin¹⁶, M. Tschoerner¹⁷, U. Weber¹⁸, S. Krüger¹⁴, H. Martiny¹⁵, J. Gebel^{16, 17}

Zusammenfassung
Gegenwärtig existieren weder in Deutschland noch international allgemein akzeptierte Methoden zur Überprüfung der Wirksamkeit von Reinigern für die Aufbereitung von Instrumenten. Die Anforderungen, die an eine adäquate Prüfmethode gestellt werden, sind: 1) Auswahl einer schwierigen zu entfer-

und verschiedene Instrumentenreiniger hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu unterscheiden. Die Besonderheit der Methode beruht auf dem Einsatz von wasserunlöslichem Fibrin als praxisrelevanter Testanschmutzung. Fibrin gilt als kritische, am schwierigsten zu entfernende Proteinanschmutzungskomponente chirurgischer Instrumente

Interessenkonflikt:
Die Autoren erklären, dass keine Interessenskonflikte bestehen. Mitglieder der

Korrespondierender Autor:
Dr. Markus Wehrl
wfk - Cleaning Technology Institute e.V.
Campus Fichtenhain 11
47807 Krefeld
m.wehrl@wfk.de

MAIN ARTICLES | Test method for comparative evaluation of instrument detergents for manual reprocessing

Notice

Working Group for Testing Detergents - AG RMT of the German Society for Hospital Hygiene (DGKH e.V.)

Test method for comparative evaluation of instrument detergents for manual reprocessing of surgical instruments on the basis of fibrin

M. Wehrl¹, U. Rosenberg², F.H.H. Brill³, H. Gabriel⁴, A. Kampe⁵, W. Michels⁶, K. Roth⁷, L. Schnieder⁸, P. Frey⁹, J. Köhnlein¹⁰, O. Rlebe¹¹, A. Hartung¹², R. Bloß¹³, G. Kirmse¹⁴, M.-T. Linner¹⁵, D. Martin¹⁶, M. Tschoerner¹⁷, U. Weber¹⁸, S. Krüger¹⁴, H. Martiny¹⁵, J. Gebel^{16, 17}

Abstract
Currently, there are neither in Germany nor at international level any generally accepted methods for verification of the efficacy of the detergents used for reprocessing of instruments. The requirements addressed to an appropriate test method are as follows:

cal relevance. Fibrin is rated as a critical protein soil component, the most difficult to remove from surgical instruments, and to date it has not been possible to measure and evaluate fibrin by means of conventional elution and protein quantification methods. Based on the development of an innovative, the

Corresponding author:
Dr. Markus Wehrl
wfk - Cleaning Technology Institute e.V.
Campus Fichtenhain 11
47807 Krefeld
m.wehrl@wfk.de

Conflict of interest:
The authors declare that they have no conflicts of

Publiziert:
ZentralSterilisation 2018;26(6):366-381
CentralService 2018;26(6):382-396

Es ist erstmals möglich, Fibrinreste zu quantifizieren.....

Es konnte demonstriert werden, dass Fibrin die schwierigste
Anschmutzungskomponente in Blut ist.....

**Wurde die Anschmutzungskomponente mit der höchsten Relevanz
aufgrund analytischer „Nicht-Erfassbarkeit“ übersehen ???**

KRINKO/BfArM:.... „100 µg Restproteingehalt/MP“....

..... bislang nur wasserlösliche Globuline?

Vorversuche eines Labors: Wirkung von praxisübl. Reinigern

Vorversuche eines Labors: Wirkung von praxisübl. Reinigern

Anmerkung des Referenten: die dargestellte Kategorisierung ist ein exemplarisches Beispiel

Wie geht es weiter...?

Aktuell laufende Arbeiten der AG RMT fokussieren auf:

- In einer Vergleichsuntersuchung (“Ringversuch-12”) untersucht die AG RMT eine Auswahl von 13 weiteren praxisverbreiteten Reinigern für die man. Aufbereitung
 - Formulierung von Bewertungsbereichen
- Entwicklung einer Prüfmethode zur Bewertung desinfizierend wirkender Reiniger für die man. Aufbereitung
 - Fixierende Wirkung oder nicht?

Danke....

Dr. Markus Wehrl
DGKH e.V.
wfk-Cleaning Technology Institute e.V.
Campus Fichtenhain 11
47807 Krefeld
m.wehrl@wfk.de
02151 / 82 10-170